

Vraag aan uw arts om een patiëntengids.



► Bewaar deze kaart.

Version 01, 02/2024

Patiëntenkaart voor Topiramaat



Voor vrouwen en meisjes die
zwanger kunnen worden
Geboortebeperking en voorkoming
van zwangerschap

► Wat moet u weten?

- Topiramaat is een geneesmiddel ter voorkoming van aanvallen van epilepsie of het voorkomen van migraine
- Topiramaat kan de gezondheid van een ongeboren kind ernstig schaden als het gebruikt wordt tijdens de zwangerschap.

► Wat moet u doen?

- Lees vóór gebruik de bijsluiter en de patiëntengids zorgvuldig door.
- Gebruik tijdens uw behandeling met topiramaat en tot minstens 4 weken na uw laatste dosis topiramaat zeer effectieve voorbehoedsmiddelen. Uw arts zal u advies geven over de methode die voor u het meest geschikt is.

- Ga minstens eenmaal per jaar naar uw arts om uw behandeling opnieuw te beoordelen.
- Als u denkt dat u zwanger bent geworden, praat dan direct met uw arts.
- Als u zwanger wilt worden, stop dan niet met het gebruik van voorbehoedsmiddelen tot u met uw arts hebt gepraat.
- Als u epilepsie heeft, mag u niet stoppen met het gebruik van topiramaat tenzij uw arts zegt dat u dit moet doen, omdat uw aandoening anders erger kan worden.